

## **E-Blast Cáncer cervical y el embarazo**

El cáncer cervical es el cuarto tumor maligno común en mujeres a nivel mundial. Esta neoplasia se asocia con mayor frecuencia a tipos de Virus del Papiloma Humano (VPH) de alto riesgo. Aunque el cáncer cervical durante el embarazo es poco común, cuando se diagnostica, se deben considerar varios factores, incluido el estadio del tumor, la edad gestacional y el posible impacto del tratamiento en el embarazo.

Por lo general, si se diagnostica temprano, el cáncer se limita al cuello uterino y puede que no necesite tratamiento inmediato. Sin embargo, si el cáncer se encuentra en un estadio más avanzado, será necesario iniciar el tratamiento lo antes posible.

El tratamiento del cáncer cervical, en algunas ocasiones, puede afectar la fertilidad. Si en el futuro le gustaría quedar embarazada, pregunte a su médico sobre las opciones que no comprometen la fertilidad. El cáncer cervical diagnosticado a tiempo puede curarse mediante la extirpación o destrucción de los tejidos precancerosos o cancerosos; por ello, es fundamental realizarse pruebas de rutina.

### **Referencias:**

<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000893.htm>

<https://www.cancer.gov/espanol/tipos/cuello-uterino/tratamiento/segun-estadio>

<https://www.cancer.org/cancer/latest-news/cervical-cancer-and-pregnancy-the-latest-research.html>

<https://www.mdpi.com/2673-3897/6/3/18>